

# 帶狀疱疹(皮蛇) 不要以身試痛

接種帶狀疱疹疫苗可提高帶狀疱疹病毒的特異性免疫力  
有效預防帶狀疱疹及其可能的併發症

欣剋疹®帶狀疱疹疫苗 **New**

伏帶疹®帶狀疱疹疫苗

製造廠商	GSK (葛蘭素史克藥廠)	MSD (美商默沙東藥廠)
疫苗類型	非活性基因重組蛋白疫苗	活性減毒疫苗
適應症	預防帶狀疱疹及其相關併發症 50歲(含)以上的成人 18歲(含)以上具罹患帶狀疱疹 風險較高成人	預防50~79歲之成人帶狀疱疹
接種時程	肌肉注射 接種兩劑	皮下注射 接種一劑
效力	50-59歲 97% 60-69歲 97% ≥70歲 91%	50-59歲 70% 60-69歲 64% ≥70歲 38%
保護 持續力	接種7年後，保護力仍有91%	接種6年後，保護力<35%
施打對象	50歲(含)以上的成人 18歲(含)以上具罹患帶狀疱疹 風險較高成人	適用於50~79歲成人施打
常見 副作用	注射部位腫痛、頭痛、 發燒、腸胃道症狀	注射部位腫痛、頭痛、 紅斑、四肢疼痛
費用	<b>\$8680元/劑 *2</b>	<b>\$6000元/劑 *1</b>

※ 帶狀疱疹疫苗為自費疫苗，接種前需由醫師評估確認是否接種